

Klinický protokol indikácií testovania SARS-CoV-2

MZSR vydáva nasledovné indikácie pre odber vzoriek výterom z orofaryngu a nazofaryngu za účelom PCR diagnostiky suspektných alebo pozitívnych osôb v súvislosti s COVID-19:

- Osoby s respiračnou infekciou, ak je priebeh infekcie dlhší ako 4 dni a ak nie je známa etiológia resp. zdroj infekcie (1)
- Skupiny občanov, ktoré majú nízku úroveň dodržiavania epidemiologických štandardov, vrátane seniorov nad 65 rokov (1)
- Pozitívna cestovateľská anamnéza pri skupinách, ktoré majú výnimku prechodu cez štátne hranice (napr. nákladná, lodná doprava) a v prítomnosti respiračných príznakov s pretrvávajúcimi miernymi príznakmi 4 a viac dní (s/ bez horúčky po dobu 4 a viac dní) alebo pri známom úzkom kontakte (1)
- Pacienti nad 65 rokov s respiračnou infekciou v zariadeniach sociálnych služieb alebo z krízovej linky (1)
- Exponovaní zdravotnícki pracovníci (3)
- Bežný alebo úzky kontakt u zdravotníckeho pracovníka (2)
- Bežný alebo úzky kontakt u člena psycho-sociálno-spirituálneho tímu pracujúceho v zdravotníckych zariadeniach a/ alebo v ambulanciách a/ alebo sociálnych službách a/alebo poskytujúceho terénnu službu podpory (3)
- Deti s pozitívnou rodinnou anamnézou alebo cestovateľskou anamnézou a/alebo respiračnými príznakmi (2)
- Tehotná žena, ak nemá skríning na SARS-CoV-2 pri dôvodnom podozrení alebo kontakte s členom, ktorý s ňou žije v spoločnej domácnosti (2)
- Pacienti s COVID-19 v domácom prostredí s miernymi príznakmi (3)
- Členovia ozbrojených zložiek MV SR a MO SR podľa špeciálne vypracovaného postupu
- Pacient pred prepustením z hospitalizácie z nariadenia lekára (1)
- Pacient po ukončení nariadenej karantény pre pozitívny záchyt COVID-19
- Tehotné pacientky so susp. na COVID-19, ktoré prišli na pôrod akútne a majú respiračnú infekciu alebo kontakt (1)
- Pacienti pred akútnym operačným výkonom v celkovej anestézii s respiračnou infekciou a/alebo známym úzkym kontaktom alebo z karantény (1)

- Psychiatrickí pacienti s nejasným sociálnym statusom (nemožnosť zobrať objektívnu anamnézu), s akútnymi bludmi alebo schizofréniou (1)
- Onkologickí pacienti pre HD-CHT, vysokodávkovanou RAT (2)
- Pacienti pred transplantáciou kostnej drene alebo iných orgánov (3)
- Test pred odberom z darcu pri autonehode (1)
- Pacienti na OAIM a JIS, ktorí majú ARI + respiračnú infekciu (alebo známu anamnézu kontaktu ev. karanténovaná osoba bez vyšetrenia PCR pri náhlom vývoji ARI) resp. s ARI s nejasnou etiológiou (2)
- Zdravotnícki pracovníci exponovaní (asymptomatickí) na exponovaných klinikách napr. infektológia, OAIM, pľúcne oddelenie, centrálny príjem, ďalej pracujúcich na drive-in, urgentnom príjme, patológ/ súdny lekár, ZZS, DZS. Odoberať výter sa odporúča v 5. deň a 14. deň ak sa jednalo o úzky kontakt avšak na rizikovitom pracovisku resp. v prvej línii zvažiť aj bežný kontakt (po dohovore s hygienikom), a rovnako aj úzky kontakt na nerizikovitom pracovisku pri potvrdenom COVID-19 pacientovi (3)
- Iní nezdravotnícki pracovníci vrátane sociálnych pracovníkov, psychológov, laborantov, členov upratovacích, prác a ďalších technických služieb v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, ak je nameraná TT nad 38 st. C a má príznaky respiračného ochorenia pri príchode na pracovisko (2)
- Traumatické stavy so zmenou vedomia a neurčité stavy na základe rozhodnutia lekára (1)
- Priame kontakty s potvrdenou koronavírusovou infekciou (2)
- Pacienti indikovaní z krízovej linky (2)
- Pacienti s COVID-19 v domácom prostredí ak sa majú dobre a ich odber indikuje hygienik, pneumológ, všeobecný lekár alebo infektológ (3)

Indikačné skupiny:

- Bezodkladné testovanie: odber vykonať ihneď najneskôr do 6 hod a vyšetrenie do 12 hod (1)
- Akútne testovanie: odber vykonať do 12 hod a vyšetrenie do 24 hod (2)
- Odkladné testovanie: odber vykonať do 72 hod a vyšetrenie do 48 hod (3)